Échographie du larynx

L'examen complémentaire au repos le plus sensible pour une **hémiplegie laryngée**. Permet également de révéler une **chondrite aryénoïdienne** ou une **dysplasie**.

Principe :

- Le muscle crico-aryénoïdien dorsal, le muscle crico-aryénoïdien latéral et le muscle vocal (*tous les trois en vert, respectivement du plus caudal au plus rostral (3)*) sont tous innervés par le **nerf laryngé récurrent**
- La dégénérescence du **muscle crico-aryénoïdien latéral** (hyperéchogène) plus facile à imager (*cercle rouge (3)*) va donc indirectement refléter la dégénérescence du **muscle crico-aryénoïdien dorsal** responsable de l'hémiplegie laryngée

@CliniquedeGrobois

Réalisation :

- Sonde linéaire ou micro convexe de 10 à 12 mHz (7 mHz acceptable).
- Nécessité de sédation, tondre (*idéalement*) et maintenir la tête en extension
- Abord latéral en coupe transversale (1), toujours comparer les lésions (7) avec le côté sain (6)

Fibrose caractéristique en cas d'hémiplegie laryngée →

@CliniquedeGrobois

Remarques :

- A l'échographie, le cartilage aryénoïde peut présenter quelques îlots hyperéchogènes normaux. S'ils sont très épais, très denses et que le contour est modifié → **chondrite**.
- L'échographie en coupe longitudinale permet de visualiser l'articulation crico-thyroïdienne. Si celle-ci est visible, une **dysplasie** peut être exclue.